




UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS



Instituto de Políticas Públicas en Salud

La Salud en la Región del BioBio y sus
circunstancias.



Contexto y Factores determinantes de la Salud Región del Biobío



Características de la Estructura de Salud en la Región

Establecimientos públicos y privados de atención de Salud

Tipo Establecimiento	Del Biobío	Resto del País	Hab/Est Biobío	Hab/Est Resto País	Dif
Clínica	10	159	209.918	99.157	-112%
Establecimiento Mediana Complejidad	2	25	1.049.591	630.640	-66%
Centro de Salud	33	346 (*)	63.612	45.566	-40%
Consultorio General Rural	13	103	161.475	153.068	-5%
Consultorio de Salud Mental	9	70	233.242	225.229	-4%
Establecimiento Alta Complejidad	8	56	262.398	281.536	7%
Servicio de Atención Primaria de Urgencia	39	238	53.825	66.244	19%
Posta de Salud Rural	181	996	11.598	15.829	27%
Consultorio General Urbano	72	391	29.155	40.322	28%
Establecimiento Baja Complejidad	18	86	116.621	183.326	36%
Centro Comunitario de Salud Familiar	33	142	63.612	111.028	43%
Hospital (No perteneciente al SNS)	6	25	349.864	630.640	45%
Laboratorio Clínico o Dental	46	178	45.634	88.573	48%
Vacunatorio	7	20	299.883	788.300	62%
Total general	477	2.835	4.401	5.561	21%
Población	2.099.181	15.766.004			

(*) a nivel nacional el 85% de ellos es privado


Existen déficit importantes en Clínicas, Mediana complejidad y Centros de Salud

Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud (DEIS)



Características del financiamiento familiar de la Salud en la Región

Porcentaje de afiliación público o privado de Salud



La 3° afiliación a FONASA más alta del país



Características de la atención y acceso en la Salud en la Región


Porcentaje de personas que tuvo un problema de acceso a atención de Salud el último año



La 2° región con la tasa más alta de problemas de acceso



Factores que determinan el nivel de salud de las poblaciones




Fuente: Canadian Institute for Advanced Research

OMS 2010




Determinantes sociales que afectan la salud de las personas





Factores	Indicador
Determ. Estructurales	% personas indigentes % personas pobres no indigentes % total de personas pobres Coef.de Gini (ingreso autónomo 2003) Tasa de desocupación Tasa de cesantía % personas que saben leer y escribir Promedio de años de escolaridad % cobertura educacional total
Condic. De vida y trabajo	% hogares con saneamiento deficitario % hogares con hacinamiento crítico % viviendas con materialidad irreparable % hogares que posee refrigerador % hogares que posee computador metros de áreas verdes por habitante % asalariados sin contrato
Estilos de vida y trabajo	% personas de 15 a 64 años activas sin cotizar % menores de 6 años control por obesidad % embarazadas en control menores de 15 años % embarazadas en control entre 15 y 19 años Tasa de denuncias violencia intra familiar Tasa de denuncias mayor connotación social
Sistema de salud	Distancia al hospital en referencia (km) % personas con probl. salud últimos 30 días % personas con probl.salud y no tuvo atención % beneficiarios FONASA % menores de 6 años control sistema público % personas 65 y más en control sistema público % mujeres 25 a 64 con PAP últimos 3 años
Bienestar - Daño en salud	% percepción salud mala y muy mala 2003 Tasa de mortalidad infantil 2007-2009 Tasa de mortalidad (todas las causas) 2007-2009 Tasa de mortalidad enf.sistema circulatorio Tasa de mortalidad por tumores 2007-2009 Tasa de mortalidad traumatismo - envenenam. Notificación por VIH y SIDA 1° sem 2012 Esperanza de vida al nacer 2005-2010




Diagnóstico reg. Biobío según factores socio-económicos, Minsal 2013



Ejemplos concretos : Enfermedad cerebrovascular

Mortalidad ECV según NEDU Bajo



Fuerte relación entre el Bajo nivel Educativo y la Mortalidad por Enfermedad Cerebrovascular

En la mayoría de las comunas sobre el 80% de las muertes por ECV, ocurre en personas con NEDU bajo

7 comunas presentan sobre el 95% de muertes por ECV con un NEDU bajo





Ejemplos concretos : Mortalidad Infantil

BRECHA DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ESCOLARIDAD DE LA MADRE x 1.000 HAB.
(COMPARACION 0 A 8 Y 13 Y MAS AÑOS)





GRÁFICO MORTALIDAD INFANTIL AJUSTADA SEGÚN ESCOLARIDAD DE LA MADRE REGIÓN DEL BÍO BÍO



	0 - 8 años	9 - 12 años	13 y más años	Región	País	Mejor región
1998 - 2000	15,6	10,1	8,5	11,6	10,3	11,0
2001 - 2003	12,2	8,9	6,2	9,3	8,4	8,5
2004 - 2006	12,2	9,0	6,2	9,2	8,4	6,1


La mayor brecha se detecta en El Carmen con 22 muertes más cada 1.000 NV

Alto Biobío y 5 comunas en Ñuble, presentan las mayores brechas



Ejemplos concretos : Tumores malignos

Tasa de Mortalidad por Tumores Malignos, según Nivel de Instrucción
País-Región del Biobío 2012





Encuesta sobre Alfabetismo Sanitario Región Biobío

Estudio Preliminar



Encuesta

- Objetivo: conocer la posibilidad que tienen las personas para entender información de salud, y de esta forma, transformarse en agentes de su propio cuidado.
- Análisis diferenciado por nivel educacional. El nivel educacional es usado generalmente como un proxy del nivel de ingresos.
- Aplicada a mayores de 15 años, **en la Región del Bío Bío.**
- La muestra abarcó 1.459 entrevistados. El nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. Se exceptúa el estrato nivel básico, que tienen un error muestral del 6%.
- **Se muestran los resultados para la población de 35 años y más.**
- **Todas las diferencias son estadísticamente significativas,** salvo que se indique lo contrario con un asterisco (*).




Diagnóstico de salud



1

¿Cómo evaluaría su estado de salud general?

Malo o muy malo



Nivel Educativo


* No significativo



2

Proporción que nunca realiza actividad física


No puede o nunca realiza ejercicio





3 ¿Qué tan limitadas se han visto sus actividades diarias a causa de problemas de salud?


Muy o moderadamente limitadas





4 ¿Cuántas veces ha ido al médico en los últimos 12 meses?

3 o más veces






Conocimiento



6

Dificultad para entender lo que le informa el personal de salud


Muy o relativamente difícil





7 Dificultad para comprender la información de los folletos que acompañan a los medicamentos

Muy o relativamente difícil






8

Dificultad para entender el etiquetado nutricional

Muy o relativamente difícil



Nivel Educativo


La diferencia entre Superior y Básica no es estadísticamente significativa



9

Dificultad para comprender la información de salud que le entregan familiares y amigos


Muy o relativamente difícil





10

Dificultad para informarse de los cambios políticos que pueden afectar su salud






11

Nivel de dificultad para encontrar información de tratamientos de las enfermedades que le preocupan


Muy o relativamente difícil





13 Dificultad para modificar aquellas conductas que afectan su salud y bienestar

Muy o relativamente difícil





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

IPSUSS

